

COMPARATIVA ENTRE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DUAL VS. TRASTORNO POR USO DE SUSTANCIAS EN UN PROGRAMA DE METADONA

Autores: O. W. MUQUEBIL ALI AL SHABAN RODRÍGUEZ¹, E. ÁLVAREZ DE MORALES GÓMEZ-MORENO³, S. OCIO LEÓN¹, M. J. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ¹, M. GÓMEZ SIMÓN¹, M.C. HUERGO LORA², A. GONZÁLEZ SUÁREZ², L. TUÑÓN GORGOJO¹.
Filiación: (1) CENTRO DE SALUD MENTAL DE MIERES. (2) HOSPITAL ÁLVAREZ-BUYLLA (MIERES). (3) CSM PUERTA LA VILLA (GIJÓN).

Objetivos:




Describir algunas de las principales características sociodemográficas y sanitarias de una muestra de pacientes que demanda asistencia dentro del programa de metadona de la UTT Mieres. Analizar la relación entre las variables estudiadas y la existencia de un diagnóstico dual, realizando un estudio descriptivo transversal, a partir de los registros en las historias clínicas. Valorar si existe variación respecto a indicadores que puedan mostrar una peor evolución y/o un peor estado general del paciente.

Métodos:

Revisión de 276 historias clínicas de pacientes usuarios del programa de metadona de la UTT Mieres. Se ha seleccionado una muestra de 40 pacientes que cumplían la condición de haber permanecido durante el año 2013 en dicho programa. 20 de estos pacientes presentan otro diagnóstico psiquiátrico asociado y los 20 restantes no. Cumplimentación de la Escala de Severidad de la Dependencia (SDS). Análisis estadístico a través del programa SPSS.

Resultados:

VARIABLE		GRUPO 1 (DUALES)	GRUPO 2
Muestra	N=	20	20
	X (DT)	X (DT)	X (DT)
Sexo	Varón	16 (80%)	14 (70%)
	Mujer	4 (20%)	6 (30%)
Edad Media		45'15 (6'02)	42'40 (6'63)
Situación Laboral	Trabaja	1 (5%)	7 (35%)
	No Trabaja	19 (95%)	13 (65%)
Adherencia (nº faltas)	<5	14 (70%)	14 (70%)
	5-10	0	2 (10%)
	>10	6 (30%)	4 (20%)
MTD/MTS	MTD	12 (60%)	6 (30%)
	MTS	8 (40%)	14 (70%)
Dosis Media		53'75 (31'37)	46 (16'67)
Periodicidad Desplazamiento	Diario	11 (55%)	6 (30%)
	Semanal	3 (15%)	6 (30%)
	Quincenal	6 (30%)	8 (40%)
Satisfacción	Insatisfecho	9 (45%)	5 (25%)
	Moderada	5 (25%)	11 (55%)
	Alta	6 (30%)	4 (20%)
Infecciones	No	4 (20%)	10 (50%)
	VIH		01 (5%)
	VHC	14 (70%)	8 (40%)
	Ambas	2 (10%)	1 (5%)
Comorbilidad Psiquiátrica	Tr. Afectivos	8 (40%)	-
	Tr. Psicóticos	6 (30%)	-
	Tr. Personalidad	6 (30%)	-
Positivos	<5	17 (85%)	14 (70%)
	5-10	1 (5%)	3 (15%)
	>10	2 (10%)	3 (15%)
Otros Tóxicos	No	7 (35%)	11 (55%)
	Cocaína	4 (20%)	5 (25%)
	Cannabis	2 (10%)	1 (5%)
	Alcohol	2 (10%)	1 (5%)
	Varios	5 (25%)	2 (10%)
Programas Especializados	Si	4 (20%)	3 (15%)
	No	16 (80%)	17 (85%)
SDS		6'80 (2'98)	6'65 (3'15)



Conclusiones:

Se ven refrendados los datos sociodemográficos y epidemiológicos obtenidos en diversos estudios respecto a un mayor número de infecciones transmisibles, mayor consumo de otros tóxicos, menor satisfacción con el tratamiento y situación de desempleo en pacientes con diagnóstico dual frente al grupo con diagnóstico único de consumo de sustancias, con la limitación del tamaño muestral.

Referencias:

- Sanvisens A, Rivas I, Faure E, Muñoz T, Rubio M, Fuster D, Tor J, Muga R. Med Clin (Barc). Characteristics of heroin dependent patients admitted to a methadone treatment program 2014 Jan 21;142(2):53-85.
- Roncero C, Fuste G, Barral C, Rodríguez-Cintas L, Martínez-Luna N, Eiroa-Orosa FJ, et al. Therapeutic Management and comorbidities in opiate-dependent patients undergoing a replacement therapy programme in Spain: the PROTEUS study. Heroin Addict Relat Clin Probl. 2011; 13(3): 5-16.
- McLellan AT, Lewis DC, O'Brien CP and Kleber HD (2000). Drug dependence a chronic medical illness: implications for treatment, insurance, and outcomes evaluation. Jama.; 284 (13):1689-95.